

Werkprotocol Aspirine eerstelijns VSV in zwang

STAP 1

Intake: cliënte heeft een indicatie voor counseling Aspirine tijdens de zwangerschap:

- 1 hoog risicofactor (PE in eerdere zwangerschap) of 2 matige risicofactoren:
- (Alle andere hoog-risico zwangeren zijn al in de 2^e lijn onder zorg)

Risico	Risicofactor
HOOG	<ul style="list-style-type: none">• Pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap• Chronische nierziekten• Auto-immuun aandoeningen zoals SLE of APS• Type 1 of 2 diabetes mellitus• Pre-existente hypertensie
MATIG	<ul style="list-style-type: none">• Nullipariteit• Maternale leeftijd ≥ 40 jaar• interval tussen zwangerschappen > 10-jaar• Pre-eclampsie in de familie-anamneses (moeder of zuster)• Obesitas (BMI > 35 kg/m²)• Meerlingzwangerschap• Placentaire insufficiëntie in de obstetrische voorgeschiedenis (bijv. eerder kind met laag geboortegewicht of perinatale sterfte t.g.v. placenta insufficiëntie of onverklaarde perinatale sterfte)• Zwangerschap na eiceldonatie

NEE: niet counselen

JA: counselen voor Aspirine gebruik: tijdens intake folder meegeven

STAP 2

- Cliënte kiest niet voor Aspirine gebruik:
 - noteren in dossier dat mevrouw hiervoor is gecounseld en de keuze die mevrouw gemaakt heeft.
- Cliënte kiest wel voor Aspirine gebruik:
 - noteren in dossier dat mevrouw hiervoor is gecounseld en de keuze die mevrouw gemaakt heeft.
 - Cliënte wordt verwezen naar de huisarts voor een consult ter bespreking Aspirine-gebruik.
 - De verloskundige is verantwoordelijk voor de indicatiestelling.
 - De huisarts is verantwoordelijk voor de controle op contra-indicaties, de interactie met eventuele andere medicatie en de uitleg over het feit dat de Aspirine offlabel wordt voorgeschreven.
 - Cliënte haalt recept op bij apotheek, start Aspirine gebruik tussen 12-16 weken.
 - Het is de verantwoordelijkheid van de verloskundige cliënte er op te wijzen dat zij bij 36 weken moet stoppen met Aspirine gebruik i.v.m. aanstaande partus.

Bijwerkingen

De bijwerkingen zijn bij lage doseringen zeldzaam en omvatten naast overgevoeligheidsverschijnselen of allergieën (1-10%) een verlenging van de bloedingsstijd met verhoogde bleedingsneiging (1-10%) en soms maagklachten (0,1-1%).

Harde contra-indicaties:

- actieve ulcus pepticum;
- maagdarmbloedingen (actief of in de voorgeschiedenis) of andere bloedingen (zoals cerebrovasculaire bloedingen);
- maagdarmp perforatie;
- ernstige nier- en leverinsufficiëntie;
- ernstig hartfalen;
- hemorragische diathese;
- hypoprotrombinemie;
- mastocytose.
- optreden van astma-aanval, urticaria, angio-oedeem of rinitis na gebruik van salicylaten of andere NSAID's.

Relatieve contra-indicaties:

(overweeg niet starten of stoppen met Aspirine of overweeg omeprazol erbij voor te schrijven)

- Maagklachten en/of maagpijn bij eerder gebruik;
- Ulcus pepticum in anamnese;
- gastritis

